

●ロタウイルスってどんな病気？

毎年冬から春にかけてロタウイルスによる胃腸炎が流行します。感染すると水のような下痢と嘔吐を繰り返し、発熱を伴うことも多くみられます。重症になると嘔吐・下痢により脱水となり、受診した子供の15人に1人が入院すると推定されています。また、白っぽい便が出ることも特徴の一つです。ロタウイルスに対するお薬はないため、ワクチンを接種して免疫をつけておくことが大切です。

ワクチンには、2種類あります。どちらかを選択してください。

●感染経路

ロタウイルス胃腸炎にかかったお子さんの便1gの中には、1億～100億個のウイルスが存在します。その多くのロタウイルスを含んだ下痢便を直接、あるいは便のついた手や指、食器などを介して間接的に口に入ることにより感染します。これを糞口（ふんこう）感染と呼びます。口から入り込んだウイルスが小腸の粘膜まで届き、そこで感染が起こります。ロタウイルスの潜伏期間は1～3日です。

●ワクチンの種類について（飲むワクチン）

種類	ロタリックス（ヒト由来1価）	ロタテック（ウシ由来5価）
回数	2回（1回1.5ml）	3回（1回2ml）
	元となるウイルス株が異なるので、接種途中で別の種類のワクチンに変更することはできません。	
おすすめ時期	初回接種は、生後14週6日までに実施するようにしましょう。	
接種期間	生後6週～24週の間 1回目は20週をすぎると接種できません。	生後6週～32週の間 1回目は24週を過ぎると接種できません。
予防効果	どちらも重症化を90%以上防ぐとされています。	
料金	1回12,728円×2回 (税込14,000円×2回)	1回8,182円×3回 (税込9,000円×3回)

※自治体により助成金がありますので、接種前に保健センターにお問い合わせください。